ALTRI DISTURBI DELLA EIACULAZIONE





Ci sono, oltre alla Eiaculazione Precoce, altri 3 disturbi eiaculatori quali

- l'Eiaculazione Retrograda

- l'Eiaculazione Ritardata

- Disordini della Emissione di liquido seminale

- l'Aneiaculazione

L'Eiaculazione Retrograda (ER) è tale quando il liquido seminale, piuttosto che spinto in uretra e quindi espulso attraverso il meato uretrale esterno, giunge in vescica mediante un meccanismo espulsivo in senso retrogrado. Ci sono 3 potenziali cause scatenanti tale problematica:

1. Cause Anatomiche (soprattutto dopo chirurgia endoscopica del collo vescicale e/o più propriamente della prostata). La chirurgia radicale della prostata invece, che contempla la asportazione di prostata,

vescicole seminali e condotti deferenti determina ostruzione completa della via seminale.

2. Cause Neurologiche (correlate all'inabilita' del collo vescicale di chiudersi durante la fase di emissione del semeà vescica diabetica, chirurgia retroperitoneale con lesione dei gangli simpatici),

3.

Cause Farmacologiche (il concetto che gli alfa-litici selettivi possano determinare tale fenomeno sembra crollato di recente: l'effetto di alcuni alfa-litici sulla via seminale sarebbe, infatti, soprattutto quello di bloccare la fase di emissione attraverso la paralisi dei condotti deferenti e quindi della progressione dello sperma).

Una metologia diagnostica per tale condizione puo' essere in casi selezionati (pazienti oligo-azoospermici normogonadici) quella della ricerca di nemaspermi in campione di urine ottenute immediatamente dopo orgasmo ed ultracentrifugate.

La terapia della ER è sempre correlata alla causa sottostante. Nei casi secondari a cause anatomiche la raccolta degli spermi nelle urine è imprescindibile per eseguire una eventuale fecondazione assistita al fine di ottenere una gravidanza. Nei casi secondari a Causa Farmacologica la sospensione del farmaco assunto rimedia reversibilmente al problema dopo breve tempo. I casi ascrivibili a Danno Neurologico appaiono difficilmente risolvibili spesso proprio in relazione alla tipologia della lesione neurologica (soprattutto nei pazienti con lesioni spinali complete). In alcuni casi, come nelle neuropatie da danno diabetico, l'uso di pseudoefedrina o imipramina può restituire una eiaculazione anterograda.

L' Eiaculazione Ritardata (con associato Orgasmo Ritardato) è uno dei più gravi disordini sessuali maschili. Questa condizione si basa sulla frequente incapacita' del paziente ad ottenere l'eiaculazione (e contemporaneamente l'orgasmo) secondo canoni temporali consueti (comunque entro 30-60 minuti dall'inizio della stimolazione sessuale).





[illegible] a.


AC VOLTS
A-C AMPERES


Epididymis
Prostate