Disfunzioni sessuali maschili

Le principali sono:

- **disfunzioni della eiaculazione** ;
- **disfunzione erettile** ;
- **calo del desiderio sessuale**: una delle cause principali può essere la carenza di testosterone e dei suoi simili. Si parla di sindrome da riduzione o mancanza di androgeni, quando si accompagna ad altri sintomi, quali progressiva stanchezza, progressiva perdita di forze e interessi, minor capacità di concentrazione sul lavoro.

  Spesso il calo del desiderio nell'uomo può derivare anche dalla presenza di una sindrome depressiva, seppur di minima entità;
- **incurvamenti penieni** (congeniti o acquisiti).

I principali **fattori di rischio** sono:

- età (> 50 anni);
- ipertensione arteriosa;
- diabete mellito;
- arterosclerosi, condizionante problemi cardiaci e malattie dei vasi periferici;
- cardiopatia ischemica;
- dislipidemie (eccesso di colesterolo e grassi nel sangue);
- fumo di sigaretta;
- eccesso alimentare ed abuso di sostanze alcoliche, uso di droghe;
- eccesso di peso corporeo, fino alla vera obesità;
- scarsa attività fisica; vita sedentaria.
- traumi fisici (ad esempio in seguito ad un incidente stradale o sul lavoro);
- terapie farmacologiche (antipertensivi, antiaritmici, inibitori di pompa gastrica ecc).
- Patologie tiroidee;
- Ridotta attrazione verso la partner (causato anche da malattie croniche della coppia);
- Disagio relazionale di coppia;
- Tumore;
- Sindrome depressiva;
- Ipogonadismo